

SEVRAGE

C'est une période toujours délicate. Le sevrage ne doit jamais se faire brusquement, mais au contraire toujours très lentement et "insensiblement".

Le chiot est à même de laper son lait, légèrement mélangé de nourriture carnée dès la troisième semaine. Le sevrage devra donc débuter dès la quatrième semaine pour se terminer la huitième ou la neuvième semaine. Chaque jour, on diminuera sensiblement la ration de lait pour la remplacer par de la nourriture à prédominance carnée, en ayant naturellement bien soin de l'augmenter en fonction du poids du chiot.

La période de sevrage étant toujours assez délicate, c'est là où l'éleveur risque de faire le plus d'erreurs alimentaires. On réduira sensiblement, ou on augmentera toujours doucement le temps du sevrage en tenant compte de l'état de santé du chiot, qui peut présenter à ce moment là, soit l'apparition de diarrhées, soit au contraire de la constipation, et c'est en fonction de ces symptômes que l'on modifiera l'alimentation.

C'est surtout dans ce cas que l'expérience de l'éleveur fera ses preuves.

Mais nous venons de citer ici des cas particuliers, qui se rencontrent, fort heureusement, assez rarement et il est bien évident que dans la majorité des cas, lorsque le sevrage se poursuit sur une période longue, tout se passe très bien et aucun de ces symptômes n'apparaît.

